

SUR QUELQUES NOUVELLES ESPÈCES DE MÉLOLONTHIDES (GENRE SERICA)  
DE CAMBODGE ET DU SIAM  
APPARTENANT AU MUSÉUM DE PARIS,  
PAR E. BRENSKE.

1. *Autoserica prabangana* n. sp.

*Patria.* — Louang-Prabang (A. Pavie, 1888). — Long. 11 millim.; lat. 7 millim. 5. — ♀. — Unicum.

Ovata, opaca, picea, supra nigro-picea; clypeo lato, anterius paulo angustato, margine leviter reflexo, apice glabro, deinde leviter ruguloso-punctato, linea subtilissima a fronte distincto; vertice nonnullis setis instructa. Thorace transverso, anterius paulo angustior, margine antico medio haud producto, lateribus medio rotundatis, setosis, angulis anticis acutis, posticis leviter rotundatis, superficie pilis minutissimis ornata. Elytris punctato-striatis, interstitiis subconvexis, disperse punctatis, punctis minutissime piliferis, parum pruinosis, apice truncatis. Pygidio apice parum convexo, paulum angustato. Segmentis abdominalibus fortiter spinosis. Femoribus posticis maxime dilatatis, apice rotundatis, ante apicem leviter sinuatis, punctis setosis robustis. Tibiis posticis latissimis, glabris, anticis latis, bidentatis. Labio, lato, deplanato. Antennae subtiliter decem articulatis, clava parva.

Cette espèce est très voisine de l'*A. statuosa* m. (*Berliner Ent. Zeit.*, 1898, p. 358), de Bangkok, dont elle diffère par l'épistome plus rétréci en avant, par les élytres moins arrondis au sommet, et par les cuisses moins échancreées à la partie latérale.

2. *Autoserica cochinchinæ* Brenske.

M. Pavie a recueilli à Phnom-Penh (Cambodge) quelques exemplaires de cette espèce qui ne diffèrent pas du type. Celui-ci provenait de Saïgon.

3. *Autoserica eluctabilis* n. sp.

*Patria.* — Cambodge, Battambang à Phnom-Penh (A. Pavie, 1886). Long. 6 millim.; lat. 4 millim. — ♀. — Unicum.

*A. Cochinchinæ* valde affinis, breviter ovata, opaca, rubro-fusca. Clypeo lato, minus angustato, margine leviter reflexo, antice leviter sinuato, subtiliter punctato, in medio ante lineam frontalem glabro, acute longitudinaliter carinato. Elytris brevioribus, irregulariter striato-punctatis. Femoribus posticis minus dilatatis, brevioribus. Ceteris ut in *A. Cochinchinæ*.

Cette espèce est très voisine de l'*A. Cochinchinæ*. Elle n'en diffère que par le clypéus, par les élytres et par certaines particularités de la punctuation. Les caractères donnés ci-dessus la définissent suffisamment.

4. *Autoserica eclogaria* n. sp.

*Patria*. — Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie, 1886). — Long. 6 millim.; lat. 4 millim. ♀.

Ovata, rufo-picea, opaca, subtus sericea, pedibus nitidis. Clypeo angustiore, lateribus fere parallelis, leviter marginato, margine antico medio acute elevato-carinato, dense subtiliter ruguloso punctato. Fronte plana. Thorace antice angustato, lateribus postice rotundatis, angulis posticis rotundatis, margine antico in medio tenuissime producto. Elytris punctato striatis, interstitiis haud convexis, aequaliter dense punctatis. Femoribus posticis glabris, parum latis, apice haud dilatatis, punctis nonnullis obscuris, tibiis posticis latis, anticis valde bidentatis. Antennis novem articulatis, clava triphylla, stipite breviore.

Elle se place à côté de l'*A. Cochinchinæ*, dont elle diffère par l'épistome très étroit et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

5. *Autoserica atavana* n. sp.

*Patria*. — Louang-Prabang à Theng (A. Pavie, 1888). — Long. 6,5 millim.; lat. 5 millim. — ♂. — Unicum.

Breviter ovata, convexa, picea, opaca. Clypeo lato, antice angustiore, apice obtuso haud sinuato, ruguloso-punctato. Fronte deplanata, subtilius punctata. Thorace transverso, longitudine duplo latiore, antice parum angustiore, lateribus tenuiter rotundatis, angulis posticis leviter rotundatis, subtiliter punctato. Elytris irregulariter punctato-striatis, interstis alternantibus convexis, distincte ac crebre punctatis, subtilissime pilosis. Pygidio convexo, apice angustiore. Femoribus posticis pariter latis, apice haud dilatatis hic rotundato, margine interiore sinuato, punctis setosis nullis aut obscuris. Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice leviter bidentatis. Antennis decem articulatis, clava flava, recta, stipite longiore. Palporum articulo ultimo breviter ovato, acuminato.

Cette espèce ressemble un peu à la *Serica holosericea*, mais elle en est bien distincte par ses jambes, par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs ne sont pas arrondis chez la *S. holosericea*. Parmi les espèces asiatiques, elle se rapproche de la *Davidis*.

6. *NEOSERICA PICEA*.

*Serica picea* Nonfried, *Berliner Ent. Zeit.*, 1891, p. 359.

*Autoserica picea* Brenske, *Berliner Ent. Zeit.*, 1898, p. 361 (Separatum, p. 251).

*Patria*. — Cambodge, Pnom-Penh (A. Pavie, 1886).

M. Nonfried n'a connu la ♀ que par un exemplaire unique, en très mauvais état et privé d'antennes. Parmi les spécimens recueillis par M. Pavie se trouve un ♂. Dans ce sexe, la massue antennaire compte quatre feuillets; elle est courbée, et sa longueur dépasse celle de l'ensemble des articles

précédents. La massue antennaire de la ♀ est aussi 4-articulée, mais elle est moins longue que l'ensemble des articles précédents.

Par ses antennes, cette espèce appartient au genre *Neoserica*. Le n° 23 de ma collection (*loc. cit.*, p. 361), provenant de Cochinchine, se rapporte à la même forme, très curieuse par la massue de la ♀.

Les exemplaires examinés ont le pygidium très sensiblement plus étroit vers le sommet que chez le type. C'est la seule différence que j'ai pu constater.

7. *Neoserica Paviciana* n. sp.

*Patria*.— Cambodge, Phnom-Penh (A. Pavi), 1886). — Long. 7 millim.; lat. 4,2 mill. ♀.

Breviter ovata, brunnea, lirida. Clypeo magno, latitudine parum breviore, antice angustiore, leviter marginato, antice truncato, subtiliter punctato. Fronto subtilissime punctata. Thorace transverso, antice in medio band producto, lateribus fere rectis, ante medium rotundatis postice vix ampliatis, angulis posticis rectis, subtilissime punctato. Elytris subtiliter striato punctatis, interstitiis planis, sat distincte ac aequaliter punetatis. Pygidio magno, convexo, apice piloso. Segmentis abdominalibus fortiter spinosis. Femoribus posticis ampliatis, leviter ovalis, apice rotundatis, glabris, setarum linea impressa instructis. Tibiis posticis parvis, latis, apice constrictis; tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis, articulo ultimo minutissimo, flagello parvo.

Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de *N. lutulosa* et elle appartient au groupe de la *N. apogonooides* m. dont un tableau a été donné p. 381 du *Berliner Ent. Zeit.*, 1898.

---

*ARACHNIDES REGUEILLIS PAR M. CHARLES VAIN CASSEL, SOUS-OFFICIER  
D'INFANTERIE ATTACHÉ À LA MISSION DU CAVALLY (SOUUDAN FRANÇAIS),  
AU POSTE DU ZÔ, EN SEPTEMBRE 1899,*

PAR M. E. SIMON.

---

1. — LISTE DES ESPÈCES.

1. *Theridion rufipes* Lucas. — Répandu dans presque toutes les régions tropicales du monde.

2. *Theridion turrigerum* sp. nov.

3. *Nephila pilipes* Lucas. — Répandu dans l'Afrique tropicale occidentale et orientale.